



Góp phần bảo vệ con trẻ.

Hướng dẫn sơ lược về các bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc-xin ở trẻ em

Tầm quan trọng của vắc-xin.

Sự xuất hiện của vắc-xin đã đẩy lùi gần như tất cả các loại bệnh gây hại cho trẻ em. Nhưng vẫn còn những đợt bùng phát dịch bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc-xin. Đây là những căn bệnh nguy hiểm có khả năng gây tử vong.

Đó là lý do tại sao Centers for Disease Control and Prevention (CDC) luôn khuyến khích việc tiêm chủng. Lịch trình chủng ngừa của Trung tâm giúp bảo vệ con quý vị trước 14 loại bệnh. Thực hiện theo lịch trình và thăm khám đầy đủ cùng bác sĩ. Hãy đảm bảo tiêm chủng cho con đúng hẹn mỗi lần.

Đừng bỏ qua bất kỳ loại vắc-xin nào.

Hiện nay vẫn có nhiều đợt bùng phát dịch bệnh tại Hoa Kỳ. Trẻ sơ sinh và trẻ em là những đối tượng có nguy cơ mắc bệnh cao hơn. Nếu không tiêm chủng thì hậu quả của các đợt bùng phát thậm chí còn tồi tệ hơn. Chỉ từ một vài trường hợp nhiễm đã lan ra thành hàng ngàn ca bệnh.

Thực hiện theo lịch trình chủng ngừa đầy đủ của CDC ở trang 4.



Góp phần bảo vệ con trẻ.

Hãy đảm bảo tiêm chủng cho con vào thời điểm cần thiết. Đây là một trong những điều quan trọng nhất để giúp con luôn khỏe mạnh.

Hãy nhớ:

- Tiêm chủng tất cả các liều vắc-xin theo khuyến nghị.
- Thời điểm là yếu tố quan trọng. Nên bắt đầu tiêm hầu hết các loại vắc-xin cho trẻ sơ sinh ở thời điểm 2 tháng tuổi. Điều này góp phần bảo vệ trẻ trong giai đoạn non nớt và có nguy cơ nhiễm bệnh cao.
- Tiêm chủng đúng lịch. Mỗi lần.

Trẻ em là đối tượng dễ có nguy cơ mắc bệnh. Đừng bỏ qua việc tiêm chủng.

Tìm hiểu về 14 loại bệnh có thể phòng ngừa được bằng vắc-xin. Xem trang 5-6.

Giải đáp các câu hỏi thường gặp.

H. Vắc-xin có gây ra bệnh tự kỷ không?

Đ. Không. Một đánh giá về 20 nghiên cứu lớn không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy vắc-xin gây ra chứng tự kỷ.

H. Vắc-xin có nguy hiểm hơn các loại bệnh mà chúng phòng ngừa không?

Đ. Không. Các loại vắc-xin đều đã được thử nghiệm trong các nghiên cứu lớn và trải qua quá trình phê duyệt lâu dài. Những căn bệnh được chủng ngừa bằng vắc-xin đều có nguy cơ gây tử vong.

H. Tiêm nhiều vắc-xin trong một ngày cho trẻ có bị coi là quá liều không?

Đ. Không. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tiêm nhiều loại vắc-xin cùng một lúc không gây ra bất kỳ vấn đề sức khỏe mãn tính nào. Xem lịch trình chủng ngừa của CDC. Thực hiện theo lịch trình đầy đủ để con luôn khỏe mạnh.



H. Tiêm chủng có gây ra tác dụng phụ không?


Đ. Có. Tác dụng phụ thường gặp nhất là đau nhức hoặc đỏ xung quanh vết tiêm. Cũng có khả năng xuất hiện tác dụng phụ nghiêm trọng, như phản ứng dị ứng, quấy khóc nhiều, sốt cao hoặc co giật do sốt. Quý vị vui lòng trao đổi với bác sĩ để tìm hiểu thêm.

Góp phần bảo vệ con trẻ.
Đừng bỏ qua bất kỳ cuộc hẹn thăm khám
với bác sĩ hay lịch chủng ngừa nào.

Thực hiện theo lịch trình chủng ngừa đầy đủ của CDC ở trang tiếp theo. ►

Dành cho phụ huynh†:

Khuyến nghị tiêm chủng cho trẻ trong độ tuổi từ sơ sinh đến 6 tuổi năm 2022



VIỆC TIÊM VẮC-XIN NGỪA COVID-19 ĐƯỢC KHUYẾN CÁO CHO TRẺ TỪ 5 TUỔI TRỞ LÊN.

LƯU Ý:

Nếu con quý vị bỏ lỡ một mũi tiêm thì quý vị cũng không cần tiêm lại từ đầu. Quý vị chỉ cần đưa con đến gặp bác sĩ để tiêm mũi tiếp theo. Quý vị vui lòng trao đổi với bác sĩ của con mình nếu có thắc mắc về vắc-xin.

CHÚ THÍCH:

* Nên tiêm hai liều cách nhau ít nhất bốn tuần cho trẻ từ 6 tháng đến 8 tuổi sắp tiêm vắc-xin ngừa cúm lần đầu tiên và một số liều cho những trẻ khác trong độ tuổi này.

§ Cần tiêm hai liều vắc-xin HepA để đem lại hiệu quả bảo vệ lâu dài. Liều vắc-xin HepA đầu tiên nên được tiêm trong khoảng thời gian từ 12 tháng đến 23 tháng tuổi. Nên tiêm liều thứ hai sau liều đầu tiên 6 tháng. Toàn bộ trẻ em và thanh thiếu niên trên 24 tháng tuổi chưa được tiêm vắc-xin cũng cần được tiêm 2 liều vắc-xin HepA.

Nếu con quý vị gặp phải bất kỳ vấn đề y tế nào khiến trẻ có nguy cơ bị nhiễm trùng hoặc đang đi du lịch bên ngoài Hoa Kỳ, quý vị hãy trao đổi với bác sĩ của con mình về các loại vắc-xin bổ sung mà trẻ có thể cần.

Để biết thêm thông tin, vui lòng gọi tới số điện thoại miễn phí
1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636)
hoặc truy cập
www.cdc.gov/vaccines/parents

Bộ Y tế và Trung tâm Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ về Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh


DTaP=bạch hầu, uốn ván và ho gà; HepA=viêm gan A; HepB=viêm gan B;
Hib=Haemophilus influenzae loại b; IPV=vắc-xin bại liệt bất hoạt;
MMR=bệnh sởi, quai bị và rubella; PCV13=vắc-xin liên hợp phế cầu;
RV=vắc-xin vi-rút rota.

Nội dung này đã được Pfizer điều chỉnh từ lịch trình tiêm chủng cho trẻ em năm 2022 của CDC.

†Đây là tài nguyên dành cho cha mẹ hoặc người chăm sóc; quý vị có thể tham khảo bản chi tiết hơn của chuyên gia y tế về lịch trình tiêm trên trang web của CDC.

Tiêm chủng đúng lịch. Bất cứ lúc nào.

Đừng để con trẻ dễ mắc phải các bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc-xin.



BỆNH THỦY ĐẬU

Thủy đậu là một loại vi-rút lây lan qua không khí hoặc qua tiếp xúc. Căn bệnh này gây ra chứng phát ban và mẩn ngứa khắp cơ thể. Bệnh này cũng có thể gây sốt và mệt mỏi. Trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến tình trạng viêm phổi, tổn thương não và tử vong.



BỆNH BẠCH HẦU

Bệnh bạch hầu là căn bệnh do vi khuẩn lây lan qua hắt hơi hoặc ho. Bệnh có thể gây đau họng, sốt hoặc khó thở. Trường hợp nghiêm trọng, bệnh có thể dẫn đến trụy tim, liệt và tử vong.



HIB (*HAEMOPHILUS INFLUENZAE* LOẠI B)

Hib là căn bệnh do vi khuẩn lây lan trong không khí khi ho hoặc hắt hơi. Bệnh có thể gây nhiễm trùng tai và sưng họng. Trường hợp nghiêm trọng, căn bệnh này có thể dẫn đến viêm màng não, viêm phổi, tổn thương não và tử vong.




VIÊM GAN A

Viêm gan A là một loại vi-rút thường được tìm thấy trong phân. Bệnh này lây lan khi tiếp xúc giữa người với người hoặc qua thức ăn, nguồn nước bị ô nhiễm. Viêm gan A có thể gây ra bệnh gan, gây đau bụng, nôn mửa và sốt. Trường hợp nghiêm trọng có thể gây suy gan, dẫn đến tử vong.



VIÊM GAN B

Viêm gan B là một loại vi-rút lây lan qua đường máu hoặc dịch của cơ thể. Bệnh này cũng có thể truyền từ mẹ sang con khi sinh. Viêm gan B gây ra bệnh gan và vàng da hoặc mắt (còn gọi là bệnh vàng da). Nó có thể dẫn đến bệnh gan mãn tính, sẹo gan, ung thư gan và tử vong.



CÚM (INFLUENZA)

Cúm là một căn bệnh do vi-rút. Bệnh lây lan khi ho, hắt hơi hoặc chạm vào các bề mặt có vi-rút. Bệnh có thể gây sốt, đau họng, ho, ớn lạnh và đau cơ. Trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến viêm phổi, viêm tim và tử vong.



BỆNH SỞI

Sởi là một loại vi-rút dễ lây lan qua ho, hắt hơi và thở. Nếu nghiêm trọng, bệnh nhân có thể phát ban, sốt, sổ mũi và ho. Trong trường hợp bệnh nghiêm trọng có thể dẫn đến viêm phổi, tổn thương não và tử vong.



BỆNH QUAI BỊ

Quai bị là một loại vi-rút lây lan qua không khí. Bệnh có thể gây sốt, nhức đầu và sưng hạch. Quai bị gây ra tình trạng sưng má và hàm. Nếu trường hợp nặng có thể dẫn đến viêm màng não, viêm não, điếc và tử vong.



PERTUSSIS (BỆNH HO GÀ)

Bệnh ho gà là bệnh do vi khuẩn lây lan trong không khí. Bệnh ho gà gây ra các cơn ho dữ dội, ảnh hưởng đến việc ăn, uống và thở. Trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến viêm phổi, nhiễm trùng não, tử vong.



BỆNH BẠI LIỆT

Bệnh bại liệt là bệnh do vi-rút gây ra. Bệnh dễ dàng lây lan qua hắt hơi, ho hoặc tiếp xúc với phân. Hầu hết những người bị bại liệt đều không có triệu chứng. Trường hợp nghiêm trọng, người bệnh có thể bị yếu tay chân, liệt và có thể tử vong.



BỆNH PHẾ CẦU KHUẨN

Bệnh phế cầu khuẩn do vi khuẩn gây ra. Bệnh lây lan khi ho hoặc tiếp xúc với dịch của cơ thể. Bệnh có thể gây ho, sốt, đau ngực, nhiễm trùng tai và khó thở. Trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến viêm màng não mủ do vi khuẩn và tử vong.



VI-RÚT ROTA

Vi-rút rota lây lan qua tiếp xúc với phân. Vi-rút rota gây tiêu chảy, nôn mửa và sốt. Trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến mất nước và tử vong.



RUBELLA (BỆNH SỞI ĐỨC)

Rubella là một loại vi-rút lây lan qua không khí. Bệnh này cũng có thể truyền cho trẻ sơ sinh trong khi mang thai. Rubella gây sưng hạch, sốt và phát ban. Đây là loại bệnh nhẹ ở trẻ em nhưng có thể nặng đối với trẻ sơ sinh. Trẻ có thể bị điếc hoặc mù bẩm sinh, mắc các bệnh về tim hoặc não nhỏ.



BỆNH UỐN VÁN (HÀM CỨNG)

Bệnh uốn ván do vi khuẩn gây ra ở vết đứt hoặc vết thương. Bệnh gây đau đầu và co thắt cơ hàm. Trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến khó nuốt, co cứng cơ nghiêm trọng và tử vong.

Đảm bảo tuân theo lịch trình
chủng ngừa đầy đủ của CDC.

Tìm hiểu thêm các nguồn tài nguyên khác. Đăng nhập ngay.

- Tự sắp xếp lịch trình tiêm chủng trực tuyến
www.vaccinecalendar.com

Dưới đây là các trang web cung cấp thông tin bổ sung về tiêm chủng cho trẻ em.

- Centers for Disease Control and Prevention*
www.cdc.gov/vaccines/parents
- American Academy of Pediatrics*
www.healthychildren.org
- American Academy of Family Physicians*
www.familydoctor.org

*Những trang web này không thuộc sở hữu và quyền kiểm soát của Pfizer. Pfizer không bảo chứng và không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc dịch vụ của các trang web này.

